Table II. *Motility index and relative motility values of* G. crumenifer *on various time points of exposure to* B. orientale *extract.*

Conc (mg/L)	0 min			10 min			15 min			30 min			60 min		
	Replicates		Mean RM ± SD	Replicates		Mean RM ± SD	Replicates		Mean RM ± SD	Replicates		Mean RM ± SD	Replicates		Mean RM ± SD
	MI	RM		MI	RM		MI	RM		MI	RM		MI	RM	
0 (NC)	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00
	3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00	
	3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00	
1	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00
	3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00	
	3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00	
2	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	2.16	0.72	0.74 ± 0.045	1.16	0.39	0.56 ± 0.083
	3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		2.04	0.68		1.92	0.64	
	3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		2.48	0.83		1.92	0.64	
3	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	2.88	0.96	0.82 ± 0.143	2.16	0.72	0.69 ± 0.013	1.16	0.39	0.45 ± 0.099
	3.00	1.00		3.00	1.00		1.60	0.53		2.04	0.68		1.92	0.64	
	3.00	1.00		3.00	1.00		2.88	0.96		2.04	0.68		0.92	0.31	
4	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	1.72	0.57	0.58 ± 0.032	0.92	0.31	0.27 ± 0.026	0.52	0.17	0.18 ± 0.015
	3.00	1.00		3.00	1.00		1.60	0.53		0.84	0.28		0.64	0.21	
	3.00	1.00		3.00	1.00		1.92	0.64		0.88	0.22		0.48	0.16	
5	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	0.80	0.28	0.25 ±0.017	0.36	0.12	0.12 ± 0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.00	1.00		0.76	0.25		0.40	0.13		0.00	0.00		0.00	0.00	
	3.00	1.00		0.88	0.22		0.36	0.12		0.00	0.00		0.00	0.00	
OXY (SC)	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	0.16	0.05	0.04 ± 0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.00	1.00		0.12	0.04		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	3.00	1.00		0.12	0.04		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

NC = Negative control; SC = Standard control; MI = Motility index; RM = Relative motility.