Table IV. *Motility index and relative motility values of* G. crumenifer *on various time modes of exposure to* M. fraxinea *extract.*

Conc (mg/L)	0 min			10 min			15 min			30 min			60 min		
	Replicates		Mean RM ± SD	Replicates		Mean RM ± SD	Replicates		Mean RM ± SD	Replicates		Mean RM ± SD	Replicates		Mean RM ± SD
	MI	RM		MI	RM		MI	RM		MI	RM		MI	RM	
0 (NC)	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00
	3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00	
	3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00		3.00	1.00	
1	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	2.96	0.99	0.97 ± 0.009	1.96	0.65	0.64 ± 0.007	1.16	0.39	0.41 ± 0.012
	3.00	1.00		3.00	1.00		2.88	0.96		1.88	0.63		1.28	0.43	
	3.00	1.00		3.00	1.00		2.92	0.97		1.96	0.65		1.20	0.40	
2	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	2.84	0.95	0.92 ± 0.024	1.56	0.52	0.51 ± 0.013	1.04	0.35	0.33 ± 0.009
	3.00	1.00		3.00	1.00		2.80	0.93		1.56	0.52		0.96	0.32	
	3.00	1.00		3.00	1.00		2.60	0.87		1.44	0.48		1.00	0.33	
3	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	2.76	0.92	0.88 ± 0.021	1.16	0.39	0.37 ± 0.007	0.60	0.20	0.19 ± 0.015
	3.00	1.00		3.00	1.00		2.60	0.87		1.08	0.36		0.48	0.16	
	3.00	1.00		3.00	1.00		2.56	0.85		1.12	0.37		0.64	0.21	
4	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	1.84	0.61	0.59 ± 0.011	1.32	0.44	0.43 ± 0.003	0.56	0.19	0.17 ± 0.007	0.20	0.07	0.06 ± 0.007
	3.00	1.00		1.72	0.57		1.28	0.43		0.52	0.17		0.20	0.07	
	3.00	1.00		1.76	0.59		1.28	0.43		0.48	0.16		0.16	0.05	
5	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	1.44	0.48	0.46 ± 0.012	0.84	0.28	0.25 ± 0.017	0.12	0.04	0.04 ± 0.006	0.00	0.00	0.00
	3.00	1.00		1.32	0.44		0.76	0.25		0.08	0.03		0.00	0.00	
	3.00	1.00		1.40	0.47		0.88	0.22		0.16	0.05		0.00	0.00	
OXY (SC)	3.00	1.00	1.00 ± 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.00	1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	3.00	1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

NC = Negative control; SC = Standard control; MI = Motility index; RM = Relative motility.